

Перед началом лечения туберкулёза с Вами проведёт беседу назначенная Вам медицинская сестра или другое назначенное лицо, которое будет наблюдать за приёмом каждой дозы назначенного Вам лекарства. Медицинская сестра должна знать информацию о Вашем здоровье, чтобы облегчить течение Вашей болезни.

Какие вопросы будет Вам обычно задавать медицинская сестра?

- ◆ Болели ли Вы раньше гепатитом (болезнь печени)?
- ◆ Есть ли у Вас жалобы со стороны желудочно - кишечного тракта?
- ◆ Была ли у Вас когда - нибудь аллергия на какое-нибудь лекарство?
- ◆ Болят ли у Вас суставы, представляет ли ходьба Вам трудности?
- ◆ Какое у Вас Зрение?
- ◆ Есть ли у Вас шум в ушах?
- ◆ Употребляете ли Вы алкоголь или наркотики? Курите ли Вы?

Государственная программа по борьбе с туберкулёзом в Эстонии



Побочные эффекты противотуберкулёзных лекарств

Материалы для чтения пациентам



Туберкулёз инфекционное заболевание, возбудителем которого является туберкулёзная палочка Коха. Туберкулёз лечат несколькими лекарствами одновременно. Успех лечения зависит от правильного лечения и регулярного приёма лекарств. Лекарства, применяемые при лечении туберкулёза, относительно безопасные, но могут вызвать побочные явления.


Серьёзные побочные явления:

- ◆ Потеря аппетита
- ◆ Тошнота
- ◆ Рвота
- ◆ Желтизна кожных покровов и склер глаз
- ◆ Температура больше трёх дней
- ◆ Боль в желудке
- ◆ Чувство жжения или снижение чувствительности при прикосновении к рукам и ногам
- ◆ Зуд кожных покровов
- ◆ Кровоточивость
- ◆ Болезненность суставов
- ◆ Нарушение зрения
- ◆ Нарушение слуха
- ◆ Звон в ушах
- ◆ Легко возникают подкожные кровоизлияния

Если у Вас появится один из перечисленных симптомов, тогда сообщите об этом сразу своему лечащему врачу или сестре. Иногда при наличии серьёзных побочных явлений нужно сделать дополнительное обследование и изменить режим лечения.

Дополнительно можно обнаружить, что:

- ◆ Моча, слюна и слёзы окрашиваются в оранжевый цвет, даже контактные линзы могут окраситься во время лечения
- ◆ Увеличится чувствительность к солнечным лучам – при необходимости используйте крем от загара
- ◆ Эффективность противозачаточных препаратов и внутриматочных средств снижается



Запомните, что туберкулёз сам может вызвать изменения в Вашем организме. Эти изменения связаны именно с болезнью, а не с её лечением.

Вы можете почувствовать следующие симптомы:

- ◆ Длительный кашель более 3 недель
- ◆ Температура
- ◆ Ночное потение
- ◆ Потеря веса
- ◆ Ухудшение самочувствия