

Tervise Arengu Instituut
Eesti Uimastiseire Keskus

Narkomaaniaravi andmekogu 2009. aasta aruanne

Tallinn 2010

Sisukord

Tabelite loetelu	3
Sissejuhatus	6
Lühiülevaade	7
1. Ravialuste sotsiaal-majanduslik kuuluvus	10
2. Andmed ravi läbiviimisest	18
3. Andmed eelneval narkomaaniravil viibimise kohta	26
4. Ravil viibinute ravieelne sõltuvusainete tarvitamise harjumus.....	28
5. Ravialuste riskikäitumine	36
6. Ravi lõpetamise teatise andmestik	39
Kasutatud kirjandus.....	41

Tabelite loetelu

- Tabel 1.** Raviteatiste jagunemine ravialuste soo- ja vanuse järgi
- Tabel 2.** Ravialuste soolis-vanuseline jaotumine
- Tabel 3.** Ravialuste rahvus soo- ja vanuse järgi
- Tabel 4.** Ravialuste kodakondsus soo- ja vanuse järgi
- Tabel 5.** Ravialuste elukoht soo- ja vanuse järgi
- Tabel 6.** Ravialuste tegevusala soo- ja vanuse järgi
- Tabel 7.** Ravialuste kõrgeim lõpetatud haridustase soo- ja vanuse järgi
- Tabel 8.** Ravialuste praeguse eluaseme tüüp soo- ja vanuse järgi
- Tabel 9.** Ravialuste leibkond soo- ja vanuse järgi
- Tabel 10.** Ravialuste jagunemine soo- ja vanuse järgi raviasutuste vahel
- Tabel 11.** Ravialuste jagunemine soo- ja vanuse järgi raviasutuse tüüpide vahel
- Tabel 12.** Ravialuste prognoositav ravi kestvus soo- ja vanuse järgi
- Tabel 13.** Ravialuste ravistaatus soo- ja vanuse järgi
- Tabel 14.** Ravialustele määratud raviliik/liigid soo- ja vanuse järgi
- Tabel 15.** Ravialuste diagnoos soo- ja vanuse järgi
- Tabel 16.** Ravialuste kaasuv psühhiaatriline diagnoos soo- ja vanuse järgi
- Tabel 17.** Ravialustele määratud ravimid soo- ja vanusrühma järgi
- Tabel 18.** Ravialuste ravile pöördumise soovitajad (ravialuste soo- ja vanuse järgi)
- Tabel 19.** Esmakordselt ravil viibimise vanuseline jaotus sugude lõikes
- Tabel 20.** Ravialuste eelneval narkomaaniaravil viibimine soo- ja vanuse järgi
- Tabel 21.** Eelneval narkomaaniaravil saadud ravimid soo- ja vanuse järgi
- Tabel 22.** Eelneval narkomaaniaravil määratud raviliik/liigid soo- ja vanuse järgi
- Tabel 23.** Ravialuste vanus esmakordsel sõltuvusainete tarbimisel sugude lõikes
- Tabel 24.** Ravialuste vanus esmakordsel peamise sõltuvusaine tarbimisel sugude lõikes
- Tabel 25.** Ravialuste peamine tarvitatav sõltuvusaine (soo- ja vanuse järgi)
- Tabel 26.** Ravialuste peamise sõltuvusaine tarvitamise viis soo- ja vanuse järgi
- Tabel 27.** Ravialuste peamise sõltuvusaine tarvitamise sagedus soo- ja vanuse järgi
- Tabel 28.** Ravialuste sekundaarne tarbitav sõltuvusaine soo- ja vanuse järgi
- Tabel 29.** Ravialuste sekundaarse sõltuvusaine tarvitamise sagedus soo- ja vanuse järgi
- Tabel 30.** Ravialuste kooselu uimastikasutajaga soo- ja vanuse järgi
- Tabel 31.** Sõltuvusaine süstimine elu jooksul ravialuste soo- ja vanuse järgi
- Tabel 32.** Ravialuste vanus esmakordsel sõltuvusaine süstimisel sugude lõikes
- Tabel 33.** Süstla ühiskasutus ravialuste soo- ja vanuse järgi

Tabel 34. Süstlanõela ühiskasutus ravialuste soo- ja vanuse järgi

Tabel 35. Ravialuste ravi lõpetamise põhjus soo- ja vanuse järgi

Tänuavaldus

Täname kõiki narkomaaniaravi andmekogu andmeesitajaid ning 2009 aasta detsembris Narkomaaniaravi andmekogu seminaril osalenud raviarste ning teatiste sisestajaid heade ideede, toetuse ja soovitude eest andmekogu töö paremaks muutmisel.

Sissejuhatus

Riiklik register Narkomaaniaravi Andmekogu (1) alustas oma tööd raviteatiste kogumisega 2008. aasta 01. jaanuaril. Praeguseks hetkeks on andmekogu töötanud kaks täis-aastat. Alus sellele andmekogule pandi juba 2005. aastal, kui riigikogus võeti vastu Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse ja sellega seonduvate seaduse muutmise seadus (NPAS) (2). Eelnimetatud seaduse § 11 panebki aluse riiklikule registrile, sätestab tema eesmärgi ja andmete esitajate ringi, määratleb andmekogu vastutava töötaja, kelleks on Sotsiaalministeerium ja volitatud töötaja, kelleks on Tervise Arengu Instituut ning kirjeldab millisel kujul andmekogu peetakse (2).

Täpsemalt välja tuues on Narkomaaniaravi andmekogu anonüümne, kuid isikustatud andmekogu, millesse on kohustatud andmeid esitama kõik psühhiaatria tegevusluba omavad tervishoiuteenuse osutajad, kui nende poole pöördub patsient sõltuvusainete (va alkohol ja tubakas) tarvitamisest tingitud probleemidega ning soovib alustada ravi (3). Anonüümne, kuid isikustatud andmekogu küll mingil määral võimaldab patsiente jälgida ka ajas, kuid ei võimalda linkida andmekogu teiste riiklike registritega, et teha põhjalikumaid uuringuid sõltlaste terviseprobleemidest. Lisaks linkimisvõimaluse puudumisele on suureks probleemiks anonüümse andmekogu puhul andmete kvaliteedi jälgimine. Kuna pole võimalik andmetes tagasi minna andmeesitaja juurde, et teatise puudusi täpsustada, siis on andmekogus mitmeid küsitavate andmetega teatise, millest osad, mille probleemid pole suured, on analüüsisesse kaasatud, kuid teine osa on analüüside korrektsuse huvides kõrvaldatud. Need nimetatud tõkked on andmekogu põhiprobleemideks hetkel ja tuleks lähiajal üle vaadata, et tagada kõigi riiklike registrite võrdne võimalus kvaliteedijärgmisele ning omavahelisele linkimisele.

2009. aastal ilmus esimene Narkomaaniaravi andmekogu tabeliraamat, mille üldstatistikud esimese andmekogu tööaasta, 2008 aasta, kohta annavad teavet ravile pääsenute hulgast, neile osutatavast ravist, patsientide sotsiaal-majanduslikust taustast, tarbitavatest sõltuvusainetest ja riskikäitumisest (4). Käesolev tabeliraamat järgib 2009. aastal ilmunud analüüside põhimõtet, et tagada andmestike võrreldavus tabeliraamatute kasutajatele.

Lühiülevaade

2009. aasta 01. jaanuarist 31. detsembrini laekus Narkomaaniaravi andmekogusse 962 teatist, ehk 73 teatist rohkem, kui andmekogu esimesel tööaastal. Neist 696 oli ravi alustamise kohta ning 266 teavitasi patsiendi ravi lõpetamisest. Peale andmebaasi puhastamist, topelt sisestatud ravi alustamise teatiste ning ravi lõpetamise teatiste, mis olid andmekokku kantud ilma alustamisteatiseta (ravi oli alustatud varem, kui 2009 aasta 01.jaanuar), jäi andmekogusse järele 838 teatist, millest 687 olid ravi alustamise ning 151 ravi lõpetamise teatised (tabel 1). Võrreldes 2008. aastaga, saabus 2009 aastal andmekogusse 69 ravi alustamise teatist rohkem, ravi lõpetamise teatisi saabus aga 70 võrra vähem. Kahe andmekogumisaasta põhjal teha järeldusi, miks ravi lõpetamise teatiste arv nii drastiliselt langes, oleks meelevaldne. Ideaalis tahaks loota, et põhjuseks on parem ravijärgimus ja väiksem väljalangemine raviprogrammidest, kuid samavõrra võib põhjuseks olla andmeesitajate poolt andmekogu põhimääruse täpsem täitmine, kus on öeldudu, et ravi lõpetamise teatis tuleb saata pikaajalise ravi lõpetamise kohta (1). Selline nõue põhimääruses aga ei õigusta end, sest kaob võimalus jälgida, kas patsient käib korralikult ravil ja lõpetab selle tulemuslikult või jätab ravi vahetult peale programmi pääsemist pooleli.

Tabel 1. Raviteatiste jagunemine ravialuste soo-ja vanuse järgi

	Ravi alustamise			Ravi lõpetamise			
	teatised	teatised	Kokku	teatised	teatised	Kokku	
Mehed	0-4	2	0	2	–	–	–
	5.-9	21	1	22	–	–	–
	10.-14	81	9	90	1	0	1
	15-19	210	57	267	12	1	13
	20-24	145	30	175	45	12	57
	25-29	47	11	58	71	18	89
	30-34	13	4	17	22	3	25
	35-39	2	0	2	1	0	1
	40-44	4	1	5	8	4	12
	45-49	2	0	2	–	–	–
	50-54	–	–	–	–	–	–
	55-59	–	–	–	–	–	–
	60+	–	–	–	–	–	–
	Kokku	527	113	640	160	38	198
Naised							

Kokku oli 2009. aasta jooksul andmekogusse sisestatud andmed 598 isiku ravilviibimise fakti kohta, 2008 aastal oli see arv 530. Neid, kelle kohta oli registris vaid üks, ravi alustamise teatis oli 437 (eelnenud aastal 303), ravi 2009 aastal alustanud ning ka lõpetanud patsiente oli 87 (2008 aastal vastavalt 149), ravi enam kui korra alustanud ning ka lõpetanud patsiente oli 52 (2008. aastal 53) ning korduvalt erinevate raviarstide või sama arsti juures, kuid erineval ajal ravi

alustanud ja 31. detsembriks 2009 ravi lõpetamist teinud isikuid on registris 22 (eelnenud perioodil 25).

Andmed näitavad, et selliseid patsiente, kes aasta jooksul on korduvalt ravi alustanud, on suhteliselt palju. Kuna narkosõltlased ei ole ei stabiilsete sotsiaal-majanduslike tunnustega ega pöördu ravile samade sõltuvusainete tõttu läbi aja, siis pole otstarbekas esitada analüüsi isikupõhiselt vaid laekunud raviteatiste põhjal. Alljärgnev analüüs ning tabelid põhinevadki ravijuhu (ravi alustamise teatise) infole või ravi lõpetamist teatise infole. Tabelite analüüs on tehtud samadel alustel, mis 2008. aasta analüüs, et tagada aastate võrreldavus.

Sarnaselt 2008. aastale oli ka 2009 aastal 77% narkomaaniravile pöördunud meest rahvad, kuid vanuseline jaotus oli mõnevõrra muutunud. Kui eelmisel arvestusaastal oli 70% ravialustest noored vanuses 20-29, siis 2009. aastal oli vastav protsent 60. Noorim ravile pöörduja oli 13 aastane ja vanim 56 (2008 aastal vastavalt 14 ja 48).

Endiselt 97%-l narkomaaniravile pöördunudest oli diagnoositud opioidide tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired. Valdavale enamusele oli peamiseks ravimiks määratud metadoon (70%) (2008. aastal 76%-le), 10% ravialustest sai buprenorfiini ning 14% narkoravile pöördunudest sai, kas ainult mõned muud ravimid, või lisaks ülalnimetatud ravimitele veel mingeid ravimeid. Kokku 72% ravialustest oli varem saanud narkomaaniravi ja veerand ei olnud kunagi sõltuvusravil viibinud. Varasemalt narkoravil viibinute arv oli 2008. aastaga võrreldes kasvanud 5%.

71% patsientidest tarvitas enne ravile pöördumist peamise narkootikumina fentanüüli analooge (fentanüül ja 3-metüülfentanüül) ning 21% heroini. Võrreldes eelmise aastaga on fentanüüli ja selle analoogide tarvitajate arv kasvanud ligi 15%, heroinitarvitajate arv aga langenud 3%. Üle poolte ravialustest olid sõltuvusainetega esmakordselt tutvust teinud vanuses 13-16 eluaastat. Patsiendi enda sõnade kohaselt oli noorim sõltuvusainetega alustamise vanus oli 9 eluaastat ning vanim alustaja 38 aastast. Valdav enamus ravile pöördunudest tarvitab narkootikum süstides, 54% neist olid süstimiskarjääriga alustanud 15-19 aastast ning 12% süstijatest oli alustanud veelgi nooremana. Ravialuseid, kes pole oma sõnade kohaselt kunagi sõltuvusainet süstinud oli 2009. aastal 4% ning neid, kes olid sõltuvusainet süstinud viimase 30 päeva jooksul oli 65%.

Võrreldes 2008. aastaga on ravialuste elukoht mõnevõrra muutunud. Kui 2008. aastal oli üle poolte ravi alustanutest pärit Ida-Virumaalt, siis 2009 aasta andmeil oli neid 39%, sevasstu oli

kasvanud Tallinnas elavate ravialuste arv (39%-lt 50%-ni). Selline muutus on seletatav sellega, et võrreldes eelmise arvestusaastaga on Tallinna ravikeskused saatnud andmekogusse 15% enam teatisi, kui eelmisel aastal, ning Ida-Virumaa ravikeskused vastupidi vähem teatisi.

81% peab end vene rahvusesse kuuluvaks ning 12% eestlasteks, 46% ravialustest olid kodakondsuseta, 45% eesti ja 6% vene kodakondsusega (2008. aastal vastavalt 43%, 43% ja 12%).

Oluliselt on kasvanud töötute ravialuste hulk. Kui 2008 aastal väitis 42% ravialustest, et olid töötud, siis 2009 aastal olid töötud koguni 61% ravi saajatest, 25% patsientidest väitis, et omas kindlat töökohta, 7% olid töövõimetuspensionärid. 53% patsientidest olid põhiharidusega, ja 24% omas keskkharidust, üksteist üle 20-aastast ravile pöördunud ei omanud põhiharidustki.

Peamiseks ravi lõpetamise põhjuseks (74% juhtudest) oli patsiendipoolne ravi katkestamine ja ravile enam mitte-ilmumine.

Tabel 4. Ravialuste kodakondsus soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
Eesti	-	-	2	14	38	101	53	20	4	1	1	1	-	235
EL kodanik	-	-	-	-	3	1	5	-	1	-	1	1	-	12
Vene	-	-	-	1	6	13	9	4	2	1	-	-	-	36
Kolmandate riikide kodanik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kodakondsuseta	-	-	-	6	34	95	78	23	6	-	2	-	-	244
	Naised													
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	Kokku
Eesti	-	-	1	10	20	32	9	-	4	-	-	-	-	76
EL kodanik	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	3
Vene	-	-	-	-	5	4	1	-	1	-	-	-	-	11
Kolmandate riikide kodanik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kodakondsuseta	-	-	-	2	18	35	11	1	3	-	-	-	-	70

Tabel 5. Ravialuste elukoht soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1–4.	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	
Riigid														
Eesti	–	–	2	21	81	210	145	47	13	2	4	2	–	527
EL riik	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mitte EL riik	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maakonnad														
Harjumaa	–	–	–	2	7	10	7	–	1	–	1	–	–	28
Tallinn	–	–	–	11	52	93	73	18	9	1	3	1	–	261
Hiiumaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ida–Virumaa	–	–	–	2	21	98	60	25	1	1	–	–	–	208
Jõgevamaa	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
Järvamaa	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Läänemaa	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Lääne–Virumaa	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Põlvamaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pärnumaa	–	–	–	3	–	3	4	2	1	–	–	–	–	13
Raplamaa	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	3
Saaremaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tartumaa	–	–	–	–	1	2	–	–	1	–	–	1	–	5
Tartu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valgamaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Viljandimaa	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Võrumaa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	Naised													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
Riigid														
Eesti	-	-	1	12	45	71	22	1	8	-	-	-	-	160
EL riik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitte EL riik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maakonnad														
Harjumaa	-	-	-	2	4	4	3	-	3	-	-	-	-	16
Tallinn	-	-	1	8	25	32	9	-	4	-	-	-	-	79
Hiiumaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ida-Virumaa	-	-	-	1	15	34	10	-	-	-	-	-	-	60
Jõgevamaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Järvamaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Läänemaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lääne-Virumaa	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Põlvamaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pärnumaa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Raplamaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saaremaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartumaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valgamaa	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Viljandimaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Võrumaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 6. Ravialuste tegevusala soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
töötav	-	-	-	-	19	86	49	7	4	-	1	2	-	168
töötu	-	-	-	9	68	163	98	40	12	1	4	-	-	395
õpilane/üliõpilane	-	-	2	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16
pensionär	-	-	-	-	-	0	4	-	-	-	-	-	-	4
kodune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Töövõimetuspensionär	-	-	-	-	1	13	21	11	1	1	-	-	-	48
kinnipeetav	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ajateenija/kaitseväelane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
muu (sh ebaregulaarne töö)	-	-	-	-	1	4	3	-	-	-	-	-	-	8
ei ole teada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Naised													
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	Kokku
töötav	-	-	-	2	14	23	3	-	2	-	-	-	-	44
töötu	-	-	-	1	33	55	18	-	10	-	-	-	-	117
õpilane/üliõpilane	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
pensionär	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kodune	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	5
Töövõimetuspensionär	-	-	-	1	5	7	4	1	-	-	-	-	-	18
kinnipeetav	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ajateenija/kaitseväelane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
muu (sh ebaregulaarne töö)	-	-	-	0	3	1	-	-	-	-	-	-	-	4
ei ole teada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 7. Ravialuste kõrgeim lõpetatud haridustase soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1–4.	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	
ei ole kunagi koolis käinud	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
algharidus (1–6kl)	–	–	2	–	1	4	1	1	–	–	–	–	–	9
põhiharidus (7–9kl)	–	–	–	19	53	105	69	18	6	1	1	–	–	272
keskharidus (10–12kl)	–	–	–	–	16	47	41	11	5	–	1	2	–	123
kutseharidus (põhi- ja alghariduseta)	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	3
kutseharidus põhi- ja keskhariduse baasil	–	–	–	1	4	27	18	4	–	1	1	–	–	56
keskeriharidus põhi- ja keskhariduse baasil	–	–	–	1	7	24	16	12	1	–	–	–	–	61
kutsekõrgharidus (rakenduskõrgharidus)	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
kõrgharidus (diplom/bakalaureus)	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	2
kõrgharidus (magister)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
doktor/teaduskandidaat	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ei ole teada	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Naised													
	1–4.	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	Kokku
ei ole kunagi koolis käinud	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
algharidus (1–6kl)	–	–	1	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	6
põhiharidus (7–9kl)	–	–	–	12	22	43	11	–	1	–	–	–	–	89
keskharidus (10–12kl)	–	–	–	–	14	16	8	–	5	–	–	–	–	43
kutseharidus (põhi- ja alghariduseta)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
kutseharidus põhi- ja keskhariduse baasil	–	–	–	–	4	2	–	–	1	–	–	–	–	7
keskeriharidus põhi- ja keskhariduse baasil	–	–	–	–	–	7	3	1	1	–	–	–	–	12
kutsekõrgharidus (rakenduskõrgharidus)	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2
kõrgharidus (diplom/bakalaureus)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
kõrgharidus (magister)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
doktor/teaduskandidaat	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ei ole teada	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1

Tabel 8. Ravialuste praeguse eluaseme tüüp soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
püsiv elukoht (korter, maja)	-	-	2	21	75	195	135	41	12	1	4	2	-	488
kindla elukohata	-	-	-	-	2	2	3	1	-	-	-	-	-	8
kinnipidamisasutus	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3
raviasutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
laste-, turvakodu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
hoolde- ja vanadekodu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
militaarasutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ei ole teada	-	-	-	-	3	11	7	5	1	1	-	-	-	28
	Naised													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
püsiv elukoht (korter, maja)	-	-	-	10	37	68	17	1	8	-	-	-	-	141
kindla elukohata	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
kinnipidamisasutus	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
raviasutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
laste-, turvakodu	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
hoolde- ja vanadekodu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
militaarasutus	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
ei ole teada	-	-	-	1	5	1	4	-	-	-	-	-	-	11

Tabel 9. Ravialuste leibkond soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1–4.	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	
üksi	–	–	–	–	7	29	27	13	3	–	1	1	–	81
vanematega	–	–	2	17	52	118	73	13	4	1	–	–	–	280
lapsega/lastega (partnerita)	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	1	–	–	5
partneriga (ilma lasteta)	–	–	–	2	7	26	13	4	3	–	1	1	–	57
partneri ja lapse/lastega	–	–	–	–	4	30	24	15	2	–	1	–	–	76
sõprade/tuttavatega	–	–	–	–	3	1	3	1	–	–	–	–	–	8
Teiste sugulastega	–	–	–	1	5	4	3	–	–	1	–	–	–	14
muu (vangla; hooldekodu jms.)	–	–	–	–	2	2	0	–	–	–	–	–	–	4
ei ole teada	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	2
	Naised													Kokku
	1–4.	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	
üksi	–	–	–	–	5	8	2	–	1	–	–	–	–	16
vanematega	–	–	–	9	16	21	9	1	2	–	–	–	–	58
lapsega/lastega (partnerita)	–	–	–	–	2	10	2	–	5	–	–	–	–	19
partneriga (ilma lasteta)	–	–	–	–	12	13	4	–	–	–	–	–	–	29
partneri ja lapse/lastega	–	–	–	–	7	17	5	–	–	–	–	–	–	29
sõprade/tuttavatega	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2
Teiste sugulastega	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2
muu (vangla; hooldekodu jms.)	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	4
ei ole teada	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1

2. Andmed ravi läbiviimisest

Tabel 10. Ravialuste jagunemine soo- ja vanuse järgi raviasutuste vahel

	Mehed													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
AS Wismari Haigla	-	-	-	4	19	47	33	11	4	-	2	2	-	122
Lääne-Tallinna Keskhaigla	-	-	-	-	8	13	15	3	1	-	-	-	-	40
Murru Vangla	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
OÜ Aasa Kliinik	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	6
OÜ Corrigo	-	-	-	-	12	54	38	15	-	-	-	-	-	119
OÜ Elulootus	-	-	-	5	22	46	32	8	7	1	2	-	-	123
OÜ Sõltuvuste Ravikes	-	-	-	-	-	6	3	2	-	-	-	-	-	11
SA Narva Haigla	-	-	-	2	7	27	19	7	1	1	-	-	-	64
SA Sillamäe Narkoreha	-	-	-	1	10	11	4	-	-	-	-	-	-	26
SA Tallinna Lastehaig	-	-	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Viru Vangla	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	5
	Naised													
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	Kokku
AS Wismari Haigla	-	-	-	4	12	6	2	1	5	-	-	-	-	30
Lääne-Tallinna Keskhaigla	-	-	-	-	4	8	2	-	-	-	-	-	-	14
OÜ Aasa Kliinik	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
OÜ Corrigo	-	-	-	-	5	24	2	-	-	-	-	-	-	31
OÜ Elulootus	-	-	-	-	14	24	8	-	3	-	-	-	-	49
OÜ Sõltuvuste Ravikes	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3
SA Narva Haigla	-	-	-	1	8	6	7	-	-	-	-	-	-	22
SA Tallinna Lastehaig	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Viru Vangla	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tabel 11. Ravialuste jagunemine soo- ja vanuse järgi raviasutuse tüüpide vahel

	Mehed													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
Ambulatoorne raviasutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
perearst	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
eriarst	-	-	-	13	81	206	145	47	13	2	4	2	-	-
statsionaarne raviasutus	-	-	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Naised													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
Ambulatoorne raviasutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
perearst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
eriarst	-	-	-	5	45	71	22	1	8	-	-	-	-	-
statsionaarne raviasutus	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 12. Ravialuste prognoositav ravi kestvus soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
lühiajaline ravi	-	-	-	5	21	70	51	18	1	1	-	-	-	-
pikaajaline ravi	-	-	2	16	60	140	94	29	12	1	4	2	-	-
Kokku	-	-	2	21	81	210	145	47	13	2	4	2	-	-
	Naised													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
lühiajaline ravi	-	-	-	2	11	31	5	-	-	-	-	-	-	-
pikaajaline ravi	-	-	1	10	34	40	17	1	8	-	-	-	-	-
Kokku	-	-	1	12	45	71	22	1	8	-	-	-	-	-

Tabel 13. Ravialuste ravistaatus soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1–4.	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	
ravi alustati	–	–	2	21	68	179	118	40	12	2	4	2	–	448
jätkatakse mujal alustatud ravi	–	–	–	–	7	23	15	5	1	–	–	–	–	51
suunatud teise raviasutusse	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ravi ei ole alustatud	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
pandud pikaajalise ravi järjekorda	–	–	–	–	3	4	3	1	–	–	–	–	–	11
otsus tegemata	–	–	–	–	3	3	9	1	–	–	–	–	–	16
	Naised													
	1–4.	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	Kokku
ravi alustati	–	–	1	12	36	62	14	1	7	–	–	–	–	133
jätkatakse mujal alustatud ravi	–	–	–	–	7	6	7	–	1	–	–	–	–	21
suunatud teise raviasutusse	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ravi ei ole alustatud	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	3
pandud pikaajalise ravi järjekorda	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2
otsus tegemata	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1

Tabel 14. Ravialustele määratud raviliik/liigid soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1–4.	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	
Võõrutusravi	–	–	–	1	4	7	3	2	–	–	–	–	–	17
Võõrutusravi asendusravimiga	–	–	–	3	13	11	18	3	1	–	1	–	–	50
Asendusravi	–	–	–	6	42	146	93	34	8	–	1	2	–	332
Sümptomite leevendus	–	–	1	6	15	33	22	5	–	1	–	–	–	83
Mittemedikamentoosne ravi	–	–	1	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	11
Toetav säilitusravi (asendusravimiga)	–	–	–	–	5	10	9	3	4	1	2	–	–	34
Muu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	Naised													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
Võõrutusravi	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	4
Võõrutusravi asendusravimiga	-	-	-	1	8	5	2	-	-	-	-	-	-	16
Asendusravi	-	-	-	3	28	52	12	1	6	-	-	-	-	102
Sümptomite leevendus	-	-	1	8	7	6	7	-	-	-	-	-	-	29
Mittemedikamentoosne ravi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toetav säilitusravi (asendusravimiga)	-	-	-	-	1	5	1	-	2	-	-	-	-	9
Muu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 15. Ravialuste diagnoos soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
F11.20	-	-	-	2	8	29	19	7	2	1	-	-	-	68
F11.22	-	-	-	4	20	57	39	12	4	-	2	2	-	140
F11.24	-	-	-	1	21	60	37	15	-	-	-	-	-	134
F11.25	-	-	-	5	30	57	46	11	7	1	2	-	-	159
F11.26	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
F11.30	-	-	-	1	-	5	2	2	-	-	-	-	-	10
F11.31	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
F12.10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F12.20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
F12.26	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
F15.10	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
F15.20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F15.24	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F15.30	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F18.20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F18.26	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F18.52	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F19.10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

	Naised													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
F11.20	-	-	-	2	8	6	7	-	-	-	-	-	-	23
F11.22	-	-	-	4	13	14	3	1	5	-	-	-	-	40
F11.24	-	-	-	-	5	18	2	-	-	-	-	-	-	25
F11.25	-	-	-	-	18	32	10	-	3	-	-	-	-	63
F11.30	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
F15.10	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
F15.20	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
F19.10	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tabel 16. Ravialuste kaasuv psühhiaatiline diagnoos soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
F10.10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F13.26	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F70.10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F91.20	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
F91.21	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Naised													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
F43.10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F43.25	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F91.20	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
F92.00	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tabel 17. Ravialustele määratud ravimid soo- ja vanusrühma järgi

	Mehed													Kokku
	1–4.	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	
Metadoon	–	–	–	6	55	149	108	35	10	1	3	1	–	368
Buprenorfiin	–	–	–	3	8	20	14	5	2	–	1	1	–	54
Muu või ei ole teada	–	–	2	12	18	41	23	7	1	1	–	–	–	105
Amitriptylin	–	–	–	2	2	9	8	2	–	1	–	–	–	24
Cipraleks	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Bromazepam	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	3
Carbamazepin	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Cymbalta	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Diazepam	–	–	1	2	3	16	8	2	–	1	–	–	–	33
Diazepex	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	3
Dimedrol	–	–	–	–	1	3	3	–	–	–	–	–	–	7
Dormicum	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
Paramax Cod	–	–	–	–	1	2	1	2	1	–	–	–	–	7
Paroxetin	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Radedorm	–	–	–	1	1	12	4	–	–	–	–	–	–	18
Rivotril	–	–	–	2	5	28	16	5	1	1	–	–	–	58
Saroten	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
Sirdalud	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2
Tisercin	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2
Tramadol	–	–	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	5
Tramal	–	–	–	–	–	2	2	–	1	–	–	–	–	5
Truxal	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Valocordin	–	–	–	1	4	8	6	1	–	1	–	–	–	21
Valocordini–diazepam	–	–	–	1	2	9	8	2	–	–	–	–	–	22
Xanax	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	4

	Naised													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
Metadoon	-	-	-	2	31	60	13	-	7	-	-	-	-	113
Buprenorfiin	-	-	-	2	5	5	2	1	1	-	-	-	-	16
Muu või ei ole teada	-	-	1	8	9	6	7	-	-	-	-	-	-	31
Amitriptylin	-	-	-	4	3	2	1	-	-	-	-	-	-	10
Bromazepam	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Cipraleks	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Diazepam	-	-	-	2	4	3	4	-	-	-	-	-	-	13
Diazepex	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Dimedrol	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	5
Imovane	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Paramax Cod	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Radedorm	-	-	-	1	2	1	4	-	-	-	-	-	-	8
Rivotril	-	-	-	1	5	6	7	-	-	-	-	-	-	19
Sirdalud	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Somnols	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tramadool	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Tramal	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Valocordin	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4
Valocordini-diazepam	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	7
Xanax	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	5
Zoloft	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tabel 18. Ravialuste ravile pöördumise soovitajad (ravialuste soo- ja vanuse järgi)

	Mehed													Kokku
	1–4.	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	
pöördus ise	–	–	–	11	70	182	139	45	12	2	2	2	–	465
perekond/sõbrad	–	–	2	9	10	23	4	2	1	–	2	–	–	53
perearst	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2
muu eriarst	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–	5
statsionaarne raviasutus	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
kiirabi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
kohus/kriminaalhooldus/kinnipidamisasutus	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
hooldekodu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
laste–, turvakodu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
kaitsevägi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Muu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ei ole teada	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Naised													
	1–4.	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	Kokku
pöördus ise	–	–	–	3	36	65	21	1	5	–	–	–	–	131
perekond/sõbrad	–	–	–	4	8	3	–	–	2	–	–	–	–	17
perearst	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
muu eriarst	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	4
statsionaarne raviasutus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
kiirabi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
kohus/kriminaalhooldus/kinnipidamisasutus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
hooldekodu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
laste–, turvakodu	–	–	1	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7
kaitsevägi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Muu	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
ei ole teada	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

3. Andmed eelneval narkomaaniravil viibimise kohta

Tabel 19. Esmakordselt ravil viibimise vanuseline jaotus sugude lõikes

	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	Kokku
Mehed	-	-	4	44	163	101	28	14	-	1	-	-	-	355
Naised	-	-	-	24	44	21	11	1	1	-	-	-	-	102

Tabel 20. Ravialuste eelneval narkomaaniravil viibimine soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
mitte kunagi	-	-	2	14	20	37	23	11	8	-	1	-	-	116
eelnevalt ravitud	-	-	-	5	59	162	117	33	5	1	3	1	-	386
ei ole teada	-	-	-	2	2	11	5	3	-	1	-	1	-	25
	Naised													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
mitte kunagi	-	-	1	10	13	17	2	-	1	-	-	-	-	44
eelnevalt ravitud	-	-	-	1	31	53	19	1	7	-	-	-	-	112
ei ole teada	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4

Tabel 21. Eelneval narkomaaniravil saadud ravimid soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
metadoon	-	-	2	35	122	91	25	4	1	1	1	-	-	282
buprenorfiin	-	-	-	8	15	16	4	2	-	1	-	-	-	46
Muu või ei ole teada	-	-	2	11	21	14	3	-	1	1	-	-	-	53
	Naised													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
metadoon	-	-	-	-	25	50	13	-	6	-	-	-	-	94
buprenorfiin	-	-	-	1	4	2	1	1	1	-	-	-	-	10
Muu või ei ole teada	-	-	-	-	3	3	5	-	-	-	-	-	-	11

Tabel 22. Eelneval narkomaaniravil määratud raviliik/liigid soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
Võõrutusravi	-	-	1	4	6	9	2	-	-	1	-	-	-	23
Võõrutusravi asendusravimiga	-	-	1	11	24	30	5	2	1	-	-	-	-	74
Asendusravi	-	-	1	29	102	64	19	2	-	1	1	-	-	219
Sümptomite leevendus	-	-	1	8	19	9	2	-	-	-	-	-	-	39
Mittefarmakoloogiline ravi	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Toetav säilitusravi (asendusravimiga)	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	5
Muu	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Naised													
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	Kokku
Võõrutusravi	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	6
Võõrutusravi asendusravimiga	-	-	-	-	10	7	4	-	2	-	-	-	-	23
Asendusravi	-	-	-	1	17	38	7	1	5	-	-	-	-	69
Sümptomite leevendus	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	6
Mittefarmakoloogiline ravi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toetav säilitusravi (asendusravimiga)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Muu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Ravil viibinute ravieelne sõltuvusainete tarvitamise harjumus

Tabel 23. Ravialuste vanus esmakordsel sõltuvusainete tarbimisel sugude lõikes

	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	Kokku
Mehed	–	1	153	265	78	20	7	3	–	–	–	–	–	527
Naised	–	–	38	96	16	7	2	1	–	–	–	–	–	160

Tabel 24. Ravialuste vanus esmakordsel peamise sõltuvusaine tarbimisel sugude lõikes

	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	Kokku
Mehed	–	–	27	185	194	81	28	10	–	1	1	–	–	527
Naised	–	1	15	53	72	10	7	2	–	–	–	–	–	160

Tabel 25. Ravialuste peamine tarvitatav sõltuvusaine (soo- ja vanuse järgi)

	Mehed													Kokku
	1–4.	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	
heroiin	–	–	–	2	10	51	35	8	3	1	1	1	–	112
metadoon	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2
teised opiaadid	–	–	–	–	2	2	–	2	–	–	–	–	–	6
fentanüül	–	–	–	10	61	145	92	30	9	1	3	1	–	352
3 –metüülfentanüül	–	–	–	1	4	5	5	3	–	–	–	–	–	18
buprenorfiin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
moonivedelik	–	–	–	–	2	5	8	4	–	–	–	–	–	19
muu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
kokaiin	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
crack	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
amfetamiin	–	–	–	3	–	–	4	–	1	–	–	–	–	8
metamfetamiin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MDMA (ecstasy) ja teised derivaadid	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
teised stimulandid	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
barbituraadid	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
bensodiasepiinid	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
teised	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LSD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
hallutsinogeensed seemed	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
teised hallutsinogeenid	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
lahustid	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
marihuaana	–	–	–	4	1	–	1	–	–	–	–	–	–	6
hasis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Teiste ainete loetelu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	Naised													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
heroiin	-	-	-	1	10	13	6	1	3	-	-	-	-	34
metadoon	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
teised opiaadid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fentanüül	-	-	-	7	32	51	11	-	5	-	-	-	-	106
3 -metüülfentanüül	-	-	-	-	2	4	3	-	-	-	-	-	-	9
buprenorfiin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
moonivedelik	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3
muu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kokaiin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
crack	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
amfetamiin	-	-	1	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	7
metamfetamiin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDMA (ecstasy) ja teised derivaadid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
teised stimulandid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
barbituraadid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bensodiasepiinid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
teised	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
hallutsinogeensed seened	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
teised hallutsinogeenid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lahustid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
marihuaana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
hasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teiste ainete loetelu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 26. Ravialuste peamise sõltuvusaine tarvitamise viis soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
süstimine	-	-	-	11	71	199	134	42	13	2	4	2	-	478
suitsetamine/inhaleerimine	-	-	-	8	8	9	10	3	-	-	-	-	-	38
suu kaudu/ joogina	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3
nuusutamine	-	-	2	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	8
muu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ei ole teada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Naised													
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	Kokku
süstimine	-	-	0	7	42	69	20	1	8	-	-	-	-	147
suitsetamine/inhaleerimine	-	-	1	5	3	2	1	-	-	-	-	-	-	12
suu kaudu/ joogina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nuusutamine	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
muu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ei ole teada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 27. Ravialuste peamise sõltuvusaine tarvitamise sagedus soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
ei tarvitanud eelmisel kuul/ tarvitanud juhuslikult	-	-	-	2	1	4	2	-	-	-	-	-	-	9
1-3 korda kuus	-	-	1	6	-	6	4	2	-	-	-	-	-	19
1 korda nädalas	-	-	1	1	1	5	7	1	1	1	-	-	-	18
2-3 korda nädalas	-	-	-	3	2	8	5	2	1	-	-	1	-	22
4-6 korda nädalas	-	-	-	1	4	6	5	1	-	-	-	-	-	17
iga päev	-	-	-	8	71	171	119	41	11	1	4	1	-	427
ei ole teada	-	-	-	-	2	10	3	-	-	-	-	-	-	15
	Naised													
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	Kokku
ei tarvitanud eelmisel kuul/ tarvitanud juhuslikult	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	6
1-3 korda kuus	-	-	1	2	2	1	3	-	-	-	-	-	-	9
1 korda nädalas	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4
2-3 korda nädalas	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
4-6 korda nädalas	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	4
iga päev	-	-	-	6	37	66	15	1	8	-	-	-	-	133
ei ole teada	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2

Tabel 28. Ravialuste sekundaarne tarbitav sõltuvusaine soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
heroiin	-	-	-	-	1	3	3	-	-	-	-	-	-	7
metadoon	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
teised opiaadid	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3
fentanüül	-	-	-	-	2	1	4	-	-	-	-	-	-	7
3 –metüülfentanüül	-	-	-	1	2	17	13	4	1	1	-	-	-	39
buprenorfiin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
moonivedelik	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	4
muu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kokaiin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
crack	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
amfetamiin	-	-	-	4	15	16	14	6	1	-	-	-	-	56
metamfetamiin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDMA (ecstasy) ja teised derivaadid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
teised stimulandid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
barbituraadid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bensodiasepiinid	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
teised	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LSD	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
hallutsinogeensed seemed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
teised hallutsinogeenid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lahustid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
marihuaana	-	-	-	2	3	4	2	1	-	-	-	-	-	12
hasis	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Alkohol kui sekundaarne tarvitav legalne uimasti	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5

	Naised													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
heroiin	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3
metadoon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
teised opiaadid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fentanüül	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3 –metüülfentanüül	-	-	-	1	5	3	4	-	-	-	-	-	-	13
buprenorfiin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
moonivedelik	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
muu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kokaiin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
crack	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
amfetamiin	-	-	-	3	3	10	4	-	-	-	-	-	-	20
metamfetamiin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDMA (ecstasy) ja teised derivaadid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
teised stimulandid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
barbituraadid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bensodiasepiinid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
teised	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
hallutsinogeensed seened	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
teised hallutsinogeenid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lahustid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
marihuaana	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4
hasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alkohol kui sekundaarne tarvitav legaalne uimasti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 29. Ravialuste sekundaarse sõltuvusaine tarvitamise sagedus soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
ei tarvitanud eelmisel kuul/ tarvitanud juhuslikult	-	-	-	3	3	3	2	1	-	-	-	-	-	12
1-3 korda kuus	-	-	1	3	5	5	8	1	1	-	-	-	-	24
1 korda nädalas	-	-	-	3	6	3	2	3	-	-	-	-	-	17
2-3 korda nädalas	-	-	-	2	6	11	8	3	-	-	-	-	-	30
4-6 korda nädalas	-	-	-	-	2	6	5	-	-	-	-	-	-	13
iga päev	-	-	-	1	3	17	12	6	1	1	-	-	-	41
ei ole teada	-	-	-	-	1	4	3	1	-	-	-	-	-	9
	Naised													
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	Kokku
ei tarvitanud eelmisel kuul/ tarvitanud juhuslikult	-	-	-	4	2	1	2	-	-	-	-	-	-	9
1-3 korda kuus	-	-	1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	7
1 korda nädalas	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
2-3 korda nädalas	-	-	-	1	1	4	2	-	-	-	-	-	-	8
4-6 korda nädalas	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
iga päev	-	-	-	-	5	7	2	-	-	-	-	-	-	14
ei ole teada	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

5. Ravialuste riskikäitumine

Tabel 30. Ravialuste kooselu uimastikasutajaga soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
elab koos	-	-	-	2	9	21	20	10	3	-	2	-	-	67
ei ela koos	-	-	2	17	64	164	105	34	9	1	2	2	-	400
ei ole teada	-	-	-	2	8	25	20	3	1	1	-	-	-	60
	Naised													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
elab koos	-	-	-	-	17	27	9	-	-	-	-	-	-	53
ei ela koos	-	-	1	11	24	39	11	1	8	-	-	-	-	95
ei ole teada	-	-	-	1	4	5	2	-	-	-	-	-	-	12

Tabel 31. Sõltuvusaine süstimine elu jooksul ravialuste soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
Ei ole kunagi süstinud	-	-	2	9	3	2	5	3	-	-	-	-	-	24
Jah, vähemalt korra elus	-	-	-	2	5	15	8	4	1	-	1	-	-	36
Jah, viimase aasta jooksul	-	-	-	4	14	35	25	8	6	1	2	-	-	95
Jah, viimas 30 päeva jooksul	-	-	-	4	58	147	100	30	5	1	1	2	-	348
Ei ole teada	-	-	-	2	1	11	7	2	1	-	-	-	-	24
	Naised													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
Ei ole kunagi süstinud	-	-	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Jah, vähemalt korra elus	-	-	-	-	1	6	3	-	-	-	-	-	-	10
Jah, viimase aasta jooksul	-	-	-	6	8	18	3	1	4	-	-	-	-	40
Jah, viimas 30 päeva jooksul	-	-	-	3	33	44	15	-	4	-	-	-	-	99
Ei ole teada	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	4

Tabel 32. Ravialuste vanus esmakordsel sõltuvusaine süstimisel sugude lõikes

	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	Kokku
Mehed	-	-	53	253	119	38	9	4	-	-	-	-	-	476
Naised	-	-	21	82	29	6	4	1	-	-	-	-	-	143

Tabel 33. Süstla ühiskasutus ravialuste soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
on kunagi kasutanud ühissüstalt, kuid mitte praegu (viimase 30 päeva jooksul)	-	-	-	6	40	118	73	23	10	1	3	-	-	274
jah kasutab praegu (30 päeva jooksul)	-	-	-	-	5	13	7	3	1	-	-	-	-	29
ei ole kunagi ühissüstalt kasutanud	-	-	2	13	29	63	51	18	1	-	1	2	-	180
ei ole teada	-	-	-	2	7	16	14	3	1	1	-	-	-	44
	Naised													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
on kunagi kasutanud ühissüstalt, kuid mitte praegu (viimase 30 päeva jooksul)	-	-	-	5	22	43	17	-	4	-	-	-	-	91
jah kasutab praegu (30 päeva jooksul)	-	-	-	2	4	5	1	-	1	-	-	-	-	13
ei ole kunagi ühissüstalt kasutanud	-	-	1	4	15	19	2	1	2	-	-	-	-	44
ei ole teada	-	-	-	1	4	4	2	-	1	-	-	-	-	12

Tabel 34. Süstlanõela ühiskasutus ravialuste soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
on kunagi kasutanud ühist nõela, kuid mitte praegu (viimase 30 päeva jooksul) jah kasutab praegu (30 päeva jooksul)	-	-	-	6	40	118	74	23	10	1	3	-	-	275
ei ole kunagi ühist nõela kasutanud	-	-	2	13	29	62	52	18	1	-	1	2	-	180
ei ole teada	-	-	-	2	7	16	14	3	1	1	-	-	-	44
	-	-	-	-	-	-	Naised							-
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	Kokku
on kunagi kasutanud ühist nõela, kuid mitte praegu (viimase 30 päeva jooksul) jah kasutab praegu (30 päeva jooksul)	-	-	-	5	23	44	17	-	4	-	-	-	-	93
ei ole kunagi ühist nõela kasutanud	-	-	1	4	15	19	3	1	2	-	-	-	-	45
ei ole teada	-	-	-	1	4	5	2	-	1	-	-	-	-	13

6. Ravi lõpetamise teatise andmestik

Tabel 35. Ravialuste ravi lõpetamise põhjus soo- ja vanuse järgi

	Mehed													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
Katkestati patsiendi ravile mitteilumise tõttu	-	-	-	-	8	42	26	7	4	-	-	-	-	87
Katkestati patsiendist mitteolenevatel põhjustel	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Katkes patsiendi surma tõttu	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Lõpetati vastastikusel kokkuleppel (tervenemiseta)	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	1	-	-	6
Suunati teise arsti juurde/teise raviasutusse	-	-	-	-	-	4	1	2	-	-	-	-	-	7
Tervenemine	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Katkestati patsiendi vägivaldse käitumise tõttu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korduv illegaalsete uimastite tarbimine ravi ajal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Välismaale tööle või elama asumine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kinnipidamisasutusse sattumine	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	6

	Naised													Kokku
	1-4.	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	
Katkestati patsiendi ravile mitteilumuse tõttu	-	-	-	1	10	11	-	-	4	-	-	-	-	26
Katkestati patsiendist mitteolenevatel põhjustel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Katkes patsiendi surma tõttu	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lõpetati vastastikusel kokkuleppel (tervenemiseta)	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
Suunati teise arsti juurde/teise raviasutusse	-	-	-	-	1	5	1	-	-	-	-	-	-	7
Tervenemine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Katkestati patsiendi vägivaldse käitumise tõttu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korduv illegaalsete uimastite tarbimine ravi ajal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Välismaale tööle või elama asumine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kinnipidamisasutusse sattumine	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1

Kasutatud kirjandus

1. Narkomaaniaravi andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus. RTI, 30.11.2006, 52, 391. Kättesaadav <http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12754176>
2. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus. RTI, 10.05.2005, 24, 180. Kättesaadav <https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=895473>
3. Tervise Arengu Instituut. Juhend Narkomaaniaravi andmekogu andmete esitajatele. Tallinn, 2007. Kättesaadav http://eusk.tai.ee/failid/Juhend_narkoravi_andmekogu_andmete_esitajatele_Avaldam311207.pdf
4. Tervise Arengu Instituut. Narkomaaniaravi andmekogu aastaaruanne 2008. Tallinn, 2009. Kättesaadav http://eusk.tai.ee/failid/Narkoravi_andmekogu_tabeliraamat2008.pdf